

ВСЕ О ПРИВИВКАХ

Иммунизация - это наш щит от большинства инфекционных заболеваний



Чем **выше** уровень иммунизации, тем **шире** защита населения



Без вакцинации **повышаются** риски развития **тяжелых** для здоровья последствий

ГРУППЫ РИСКА: в данных группах риск заболеваний особенно велик



Пожилые люди



Взрослые с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом



Дети

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?



В медицинских учреждениях

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НЕОБХОДИМО



Заполнить согласие и пройти осмотр врача

ВАКЦИНИРУЙСЯ И СОХРАНИ ЖИЗНЬ!



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

КОРЬ – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °С), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто – папулёзной сыпью кожных покровов.



При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.



Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
Помните, что ваше здоровье и здоровье ваших детей в ваших руках!



Подробнее на
www.rospotrebnadzor.ru



Прививки детям

Дифтерия



Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- V1 – в 3 месяца
- V2 – в 4,5 месяца
- V3 – в 6 месяцев.
- RV1 – в 18 месяцев
- RV2 – в 6-7 лет
- RV3 – в 14 лет*



Тяжелые осложнения дифтерии встречаются часто и связаны с действием дифтерийного экзотоксина. Его «излюбленные» мишени - сердце и нервная система

* В дальнейшем рекомендуется проводить ревакцинацию каждые 10 лет

ДИФТЕРИЯ

это серьезное заболевание, которое вызывается токсинами, вырабатываемыми дифтерийной коринебактерией.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ



Лихорадка



Боль в горле,
шумное
дыхание



Слабость



Серые пленки на
задней
поверхности глотки
и миндалин

**БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ
ДИФТЕРИЯ
ОПАСНА РАЗВИТИЕМ
ОСЛОЖНЕНИЙ:**



Затрудненное
дыхание,
удушье



Миокардит
(поражение
сердечной
мышцы)



Поражение
нервной
системы



Летальный
исход

**ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ДИФТЕРИИ НЕОБХОДИМА В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕЙ ЖИЗНИ!**

Дети: вакцинация трехкратно в 3, 4.5 и 6 месяцев

1-я ревакцинация в 18 месяцев

2-я ревакцинация в 6-7 лет

Подростки: 3-я ревакцинация в 14 лет

Взрослые: подлежат ревакцинации
каждые 10 лет



ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ!



Корь

Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- **V** – в 12 месяцев,
- **RV** – в 6 лет

Корь – одно из самых заразных инфекционных заболеваний: каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним **неиммунных к кори** людей.



КОРЬ

ЭТО ВЫСОКОКОНТАГИОЗНОЕ
заболевание

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...



После контакта с больным
заболевают
100% лиц, не имеющих
иммунитет!

У КАЖДОГО ПЯТОГО



заболевшего корью развиваются
осложнения

Такие как энцефалит, пневмонии,
вплоть до летального исхода



Наибольший риск
**опасных
осложнений** - у
детей до 5 лет и
взрослых старше
20 лет



Против кори существуют
**безопасные и
эффективные** вакцины.
Они проходят
тщательные испытания,
и за более 50 лет
использования
зарекомендовали себя
как очень безопасные.



Доза вакцины
против кори
способна
обеспечить **защиту**
от болезни
практически на
100%.

ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ КОРИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРЬ

Защититесь сами и защитите
других - обеспечьте вакцинацию
для себя и своих близких.

**ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В
ВАКЦИНАЦИЮ!**

